

Колосов А.М., Лавров Н.П., Наумов С.П. Снежный барс, или ирбис, — *Felis uncia* Schreb. // Биология промысловых зверей СССР. — Москва: Высшая школа, 1961. С. 89-90.

Снежный барс, или ирбис, — *Felis uncia* Schreb.

Внешним видом напоминает леопарда, но окраска барса дымчато-серая, почти без примеси желтого цвета. Темно-бурые или черные пятна, разбросанные по всему телу и хвосту, кольцеобразные, неясно очерченные, крупные, их диаметр около 6 см. На голове пятна сплошные. Волосистой покров довольно высокий и мягкий. Хвост относительно длиннее, чем у леопарда, пышно опушенный. Конечности относительно короткие. Длина тела около 130 см, хвоста — 90 см, высота в плечах — до 60 см.

Населяет горы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Алтая (карта XII). За пределами СССР распространен в Китае и Монголии.

Обитает в высокогорье, где придерживается пояса альпийских лугов, снежников и каменистых россыпей; поднимается в летнее время до высоты 4000 м. Зимой, при наличии высокого снежного покрова, спускается ниже, но в предгорьях попадает редко. Местами такие перекочевки носят регулярный сезонный характер, что связано с периодическими перемещениями диких козлов и баранов. В некоторых районах барс живет круглый год в нагорной степи на высоте 600—1000 м.

Логово чаще устраивает в глухих ущельях, в пещерах или в Расселинах скал. Охотится преимущественно в сумерки и ночью. Ведет бродячую жизнь; самка с молодыми котятками придерживается небольшого района.

Основной пищей служат копытные — горный козел, архар, кабан, косуля. Поедает горных индеек, сурков и других более мелких птиц и грызунов. Изредка нападает на овец.

Течка протекает зимой и в начале весны. Беременность продолжается 90—100 дней. В помете бывает до 5 котят. В середине лета они уже следуют за самкой; нередко выводок не распадается до весны. Линяет два раза в год.

Численность барса повсеместно невелика. Он приносит некоторый вред охотничьему хозяйству и животноводству.

Род гепарды — *Acinonyx*


Род представлен единственным видом.

Гепард — *Acinonyx jubatus* Schreb.

Длина тела около 130 см, хвоста 75 см, уши сравнительно небольшие. Основной цвет верхней стороны тела и наружной поверхности конечностей ржаво-буланный. Передняя часть морды более светлая, почти белая. Сплошные черные, мелкие пятна равномерно расположены по спине и бокам, также на ногах и голове, исключая переднюю часть морды. На хвосте черные пятна ближе к концу сливаются в широкие черные кольца. Низ тела белесый. Волосистой покров короткий.

Гепард встречается в Туркмении, изредка одиночные звери заходят в юго-западную часть Казахстана. Широко распространен в Африке и юго-западной Азии.

Биология мало изучена. В Туркмении обитает в глинистых и песчаных пустынях, чаще на участках, слегка всхолмленных, и в предгорьях. Может долго бегать, на коротком расстоянии развивает скорость до 95 км в час. Питается главным образом джейранами, зайцами, песчанками. Беременность продолжается около трех месяцев, в выводке бывает 2—4 детеныша. Повсеместно крайне редок. Как пушной вид никакого значения не имеет. В Индии и Иране, а также в Киевской Руси приручался и использовался для охоты за мелкими копытными.



Карта XII. Географическое распространение: 1- росомахи, 2 – барсука, 3 – медоеда, 4- леопарда, 5- барса