

Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Снежный барс, или ирбис. // Следы в природе. – Москва: Наука, 1990. С. 151.

Снежный барс, или *ирбис*. Распространен в пределах СССР в горах Средней Азии, Казахстана, Алтая, Саян. Заселяет альпийские луга высокогорий, глухие ущелья, скалы у границы вечного снега, реже лесной пояс. Логово устраивает в расщелинах скал, в пещерах, под нависшей плитой, где укрывается днем.

Добывает горных козлов и баранов, кабанов, косуль, сурков, горных индеек. Охотится скрадыванием из-за укрытий. Когда жертва приблизится, ирбис прыжками настигает ее. Если добыча ускользает, ирбис после нескольких прыжков прекращает преследование. Иногда снежный барс затаивается над тропой, по которой ходят горные козлы или другие копытные — его жертвы. Случается, что ирбис гонится на значительном расстоянии за своей жертвой. В конце лета, осенью и в начале зимы ирбисы могут охотиться группой, представляющей собой семью. Добытое животное затаскивается в укрытие и там поедается. Возле остатков добычи сохраняются лоскуты кожи. Остатки добычи волка—основного конкурента ирбиса — не имеют кожи, хищники съедают ее или она изорвана ими на мелкие клочки. Череп жертвы ирбиса остается целым, в то время как волки отгрызают у него носовую часть, ломают глазницы, а иногда расширяют затылочное отверстие и достают мозг. Следы ирбиса большие, круглые, без отпечатков когтей, длина их около 7,8 см, ширина 7,5 см. Длина простого шага 41 — 46 см, длина прыжков 160 — 290 см. Плюсневой и пястный мякиши сравнительно небольшие (см. рис. 44, л, н).

Отпечатки лап (см) и следовые дорожки: *а*, *б* — домашней кошки на илу солончака (3,4x3,2); *в-г* — кавказской лесной кошки (4,5x3,7); *в* — задней, *г* — передней (3,9x4,6); *д* — передней леопарда (12x12); *е* — следовая дорожка леопарда; *ж* — левой передней европейской дикой кошки; *з* — дикой кошки на снегу; *и* — камышового кота, или хауса, на илу (5,0x6,0); *к* — следовая дорожка хауса на медленном ходу; *л* — следовая дорожка ирбиса на шаге и на прыжках; *м* — рыси на сугробе снега весной (волосы на подошве почти полностью вылиняли — 7,0x6,0); *н* — ирбиса (7,8x7,5) (*а*, *б*, *в*, *г*, *и*, *м* — по Формозову, 1952; *ж*, *з* — из «Приложения»; *к*, *л*, *н* — по Гептнеру, Слудскому, 1972; *д* — ориг., Приморский край).

Рис.44. Кошачий тип следов

