

Павлинов И.Я., Борисенко А.В., Крускоп С.В., Яхонтов Е.Л. РОД *UNCIA* Gray, 1854 // Млекопитающие Евразии. II. Non-Rodentia. Систематико-географический справочник. – Москва: Московский университет, 1995. С. 167-168,

РОД *UNCIA* Gray, 1854

СИСТЕМАТИКА. Нередко включается в р. *Panthera*; родовой статус обоснован кладистически (Salles, 1992). 1 вид.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Высокогорья Центр. Азии (Тибет, Памир, Тянь-Шань, Алтай).

~ *uncia* (Schreber, 1776)

СИНОНИМЫ. = *irbis* Ehrenberg, 1830; *uncioides* Horsfield, 1855; *schneideri* Zukovsky, 1950/

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Как указано для рода.

РОДЫ И ПОДРОДЫ FELIDAE

1. Конечности высокие и тонкие, с притупленными невяжными когтями. От внутреннего угла глаза вдоль носа к верхней губе идет контрастная черная полоса. Общая окраска светло-желтая с частыми сплошными темными пятнами. Поперечный диаметр подглазничного отверстия в 2 раза меньше расстояния от верхнего края этого отверстия до глазницы. Внутренняя лопасть верхнего Р4 слабо выражена, без бугорка, или отсутствуют *Acinonyx* (с. 168)
 - Конечности относительно короткие, мощные, с втяжными когтями. Контрастной черной полосы от глаза к верхней губе нет. Общая окраска иная. Поперечный диаметр подглазничного отверстия больше или равен расстоянию от верхнего края этого отверстия до глазницы. Внутренняя лопасть верхнего Р4 хорошо развита, с бугорком (корме *Otocolobus*) 2
2. Длина тела более 100 см. Кондилобазальная длина черепа более 165 мм. Длина верхнего Р4 более 21 мм 3
 - Длина тела менее 100 см. Кондилобазальная длина черепа менее 165 мм. Длина верхнего Р4 менее 21 мм 4
3. Окраска без всякой примеси желтого цвета. Пятна на спине более 5 см в поперечнике, расплывчатые, бледные. Толщина хвоста равна толщине средней части предплечья. Кондилобазальная длина черепа менее 180 мм. Длина носового шва незначительно превышает наибольшую суммарную ширину носовых костей. Передне - наружная (экзотимпанальная) часть слухового барабана сильно развита, септа, ее отделяющая, проходит почти по середине барабана *Uncia* (с. 167)
 - Окраска с большей или меньшей примесью желтого цвета. Пятна на спине, если есть, менее 5 см в поперечнике, обычно резко очерченные, либо окраска не пятнистая. Толщина хвоста заметно меньше толщины средней части предплечья. Кондилобазальная длина черепа более 180 мм. Длина носового шва минимум в 1,5 раза превышает наибольшую суммарную ширину носовых костей. Почти весь слуховой барабан образован задне - внутренней (энзотимпанальной) частью, экзотимпанальная - очень мала, разделительная септа проходит рядом со слуховым отверстием *Panthera* (с. 166)
4. Заглазничные отростки черепа зачаточные. Длина верхнего клыка примерно в 3 раза больше его диаметра у альвеолы. Длина верхней диастемы не меньше длины верхнего Р3. Подбородочный выступ нижней челюсти хорошо развит, нижний край челюсти в этом месте образует почти прямой угол *Neofelis* (с. 166)