

**Закиров А.** Кошки // Позвоночные животные Ферганской долины. – Ташкент: ФАН УзССР, 1974. С. 196-198.

### Пятнистая кошка - *Felis silvestris caudate* Gray.

Размеры тела (2 самца и 5 самок) : длина тела самцов 57 - 58 см, самок - 50 - 61; длина хвоста самцов 30 - 34 см, самок - 27 - 32; длина задней ступни самцов 13 - 15 см. самок - 12 - 15; высота уха самцов и самок 5 - 6 см. Размеры черепа (4 самца и 4 самки): общая длина у самцов 94-102 мм, у самок – 91-97; кондилобазальная длина у самцов 85-94 мм, у самок – 83-90; длина лицевого отдела у самцов 63-68 мм, у самок – 59-64; длина мозгового отдела у самцов 53-60 мм, у самок – 54-56; скуловая ширина у самцов 65-74 мм, у самок – 65-69; межглазничная ширина у самцов 19--20 мм, у самок – 15-19; заглазничная ширина у самцов 32-35 мм, у самок – 33-37; высота черепа 33-37 мм; высота черепа против барабанных камер у самцов 40-45 мм, у самок – 42-44.

Окраска меха у пятнистой кошки сильно варьирует. У самца, добытого в верхней части ущ. Кассансай, основной тон серый, с размытыми черно-бурыми пятнами на спине и буроватой крапчатостью по бокам и брюшной части тела. На подбородке волосы белые, но основание их дымчатого цвета. Хвост серый, на основной части черно-бурая пятнистость, на концевой половине 6 черно - бурых сильно размытых колеи. У самки с

Т а б л и ц а 97

Пища пятнистой кошки

Пищевые объекты	% встреч от 105 данных
Заяц-толай	4,8
Грызуны	91,4
Песчанки	74,3
Полуденная	59,0
Краснохвостая	11,4
Домовая мышь	10,0
Птицы (мелкие воробьиные)	11,4
Пресмыкающиеся (ящерицы и змеи)	5,7
Беспозвоночные (насекомые)	9,5 (3,8)
Медведки	4,8 (2,0)
Жуки-чернотелки и личинки жуков	4,8(1,0)

низовьев Кассансая основной цвет окраски палевый. На спине слабо выраженная пятнистость — это скорее рябь. На брюхе бурые тона отсутствуют, основание волос дымчатого цвета. Хвост серый с палевым налетом и черно-бурой рябью. Единственное черно-бурое кольцо слабо выражено лишь на самом конце хвоста.

В Ферганской котловине пятнистая кошка широко распространена. Она обычна в Язъяванских песках, где мы ее наблюдали у ст. Буванды и близ кишл. Кызылтапа (Буровая). В Зоологическом музее МГУ хранятся шкуры *Felis lybica* из коллекции Б. Образцова, собранной зимой 1928 г. близ г. Намангана. В нашем распоряжении была самка, пойманная 15 февраля 1959 г. в восточной части Туркестанского хребта на горе Катрон у кишл. Сох. Склоны гор в месте обитания зверя покрыты редким арчевником. В

предгорьях Чаткальского хребта пятнистая кошка найдена 20 апреля 1969 г. в долине Реззакская недалеко от г. Намангана. Местность здесь представляет собой всхолмленную степь, изрезанную оврагами. В такой же местности три кошки добыты охотниками кишл. Кассансай. В предгорьях обитает и на богаре с зерновых хлебов. Укрывается здесь в пещерах, размытых водой в конгломератных пластах аллювия. Одна самка добыта в горах Чаначая. В среднем поясе гор животное обитает в ущельях с зарослями из барбариса, жимолости, иргая, таволги, эфедры с редкими деревьями арчи, яблони, грецкого ореха, березы.

В питании пятнистой кошки основное место занимают главным образом песчанки из рода *Meriones* (табл. 97). Из беспозвоночных в большом количестве поедаются медведки, вредители кукурузы и бахчевых культур.

Дикая кошка полезна как в культурном ландшафте, целинных землях, в горах или на равнинной части долины.

В Ферганской долине и окружающих ее горах за время с 1959 по 1967 г. ежегодно заготавливалось на пушнину от 29 до 95 шкурок пятнистой кошки, в среднем 54 шкуры в год. Вред, причиняемый этим хищником, истребляющим зайцев, птиц, ящериц и других полезных животных, не велик и практического не имеет. Охоту на пятнистую кошку необходимо строго лимитировать, исходя из местных условий.

### **Бледная рысь - *Felis lynx isabellina* Blyth.**

Размеры самки: длина тела 70 см, хвоста 15, задней ступни 18 см, высота уха 7,5. Вес тела 4,3 кг.

Размеры черепа (1 самец и 1 самка): общая длина самца 129 мм, самки 116, кондилобазальная длина соответственно и 102; длина лицевого отдела 86 и 69, мозгового отдел скуловая ширина 73 и 76; межглазничная ширина 27 и 22, заглазничная ширина 43 и 42; высота в области слуховых камер 57 и 56 мм.

Рысь в Средней Азии обитает только в горных лесах. В горах окружающих Ферганскую долину, распространена широко, но всюду редка. Одна самка добыта нами на северных склонах Алайского хребта в ущ. Шахимардан близ оз. Голубого. Держится здесь в арчевниках по глухим ущельям. В Чаткальских горах по сообщению сотрудников Алабукинского орехоплодного заказника, отмечена в верхней части Чаначая. Обитает в каменистых ущельях, укрываясь в зарослях из тяньшаньской ели и арчи, с примешанными к ним березой, рябиной и кустами барбариса, шиповника, бересклета, черной смородины.

Заготовка рыси не планируется и сведений о том, сколько ее добывается в Ферганской долине, нет.

### **Ирбис, или снежный барс - *Uncia uncia* Schreber**

В восточной части Чаткальского хребта снежный барс обитает в горах Акчала. Летом здесь пасутся овцы и были случаи нападения хищника на отары. Барс близок к полному исчезновению. Нападения его на домашних животных исключительно редки и вред этого хищника фактического значения не имеет. Необходим полный запрет отстрела барса.