

Корелов М.Н. Фауна позвоночных Бостандыкского района. // Природа и хозяйственные условия горной части Бостандыка. Алма-Ата, 1956. С. 269. 314

Бостандыкский район занимает совершенно исключительное положение благодаря типичному горному рельефу, обилию воды и климату субтропического типа. Отсюда исключительное богатство и своеобразие его природных ресурсов, отсюда и специфичность его хозяйственных перспектив.

Вместе с тем естественные производительные силы района оказались почти совершенно неизученными, в частности в зоологическом отношении, поэтому Институт зоологии Академии Наук Казахской ССР решил организовать изучение фауны позвоночных животных Бостандыкского района.

Проведение этой работы было поручено автору этой главы - М.Н. Корелову.

Полевые исследования велись в течение двух летних периодов 1948 и 1949 гг. Кроме автора, в них принимали участие в 1948 г. аспирант института, паразитолог Л.В. Левит и лаборант В.С. Скиба, а в 1949 г. лаборант Д.И. Чекменев. В 1949 г. работы велись в комплексе с сотрудником Института ботаники, кандидатом биологических наук Б.А.Быковым.

*Felis uncia* Shreb. Барс в пределах района обитает в верхней части Чаткальского, Псемского и Угамского хребтов. Следы барса мы встретили на снежнике у гребня Псемского хребта в верховье Ихнач-сая 20 июля 1949 г. Зимой, передвигаясь за стадами горных козлов, спускается на солнцепечные до высоты 2000-2500 м, т.е. ниже верхней границы распространения высокоствольной арчи.